



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SECRETAR DE STAT**

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII SECRETAR DE STAT
Nr. <u>ASC 279</u>
Ziua <u>11</u> Lună <u>11</u> Anul <u>09</u>

CĂTRE

DIRECTIILE DE SANATATE PUBLICA JUDETENE SI A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

In atentia Doamnei/Domnului Director Coordonator
Doamnei/Domnului Director Coordonator Adj. de sanatate publica si programe

Avand in vedere situatia epidemiologica a infectiei gripale A/H1N1 pe teritoriul Romaniei, in cadrul sedintei Comitetului Central de coordonare pentru gripe pandemica din cadrul Ministerului Sanatatii din data de 9 noiembrie 2009 au fost stabilite o serie de masuri si proceduri de lucru care vor aplica de la data prezentei adrese.

Procedurile de lucru prevazute in anexele 1-6 vor fi aduse la cunostinta intregului personal medico-sanitar din unitatile sanitare, precum si Inspectoratelor judetene pentru Situatii de urgență.

Cu stima

**SECRETAR DE STAT
PROF DR ADRIAN STREINU-CERCEL**



Anexa 1

**CRITERII
PENTRU INDRUMAREA PACIENTULUI CATRE SPITALUL DE BOLI
INFECTIOASE/ UNITATI PRIMIRE URGENTE**

1. SE TRIMITE LA SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE -Cazul compatibil cu gripe care are factori de risc pentru evaluare si decizie.
2. SE TRIMITE LA SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE/UPU - Cazul compatibil cu gripe, care are urmatoarele manifestari (insotit de fisa anexata):
 - Dispneea severa: (tiraj, cornaj, incapacitatea de a emunta in intregime o propozitie scurta din cauza lipsei de aer, in lipsa altel cauze
 - Frecventa respiratorie > 30/min, masurata pe durata unui minut
 - Instalarea recenta a unei respiratii patologice (perioade de apnee, alternand cu polipnee), in lipsa altel cauze
 - Deshidratare severa: pliu cutanat lenes, TA sistolica <90 mmHG, TA diastolica <60 mmHg, in lipsa altel cauze
 - Alterarea starii de constienta (confuzie, agitatie psihomotorie , convulsii), in lipsa altel cauze
 - Alte manifestari severe recent instalate si fara cauza evidenta (deteriorarea rapida a starii pacientului).

NOTA: Criteriile sunt orientative, nu inlocuiesc rationamentul medical

Febra izolata nu este criteriu de indrumare catre spital si are valoare redusa pentru aprecierea severitatii

In cazul agravarii starii clinice pacientilor li se recomanda sa se prezinte la un spital de boli infectioase

Pentru fiecare pacient evaluat trebuie inregistrata ziua si ora consultului.

FACTORI DE RISC:

- varsta > 65 ani,
- sarcina (mai ales ultimete trimestre),
- post-partum (2 luni post-partum, inclusiv dupa pierderea de sarcina),
- co-morbiditati:
 - Boli cronice respiratorii (atentie astm bronsic !!)
 - Boli cronice cardio-vasculare (cu exceptia HTA izolate)
 - Boli cronice hepatice
 - Boli cronice hematologice
 - Boli cronice renale (atentie pacient dializat !!)
 - Boli cronice neurologice si neuro-musculare
 - Boli cronice de nutritie (atentie pacient cu diabet zaharat !!)
 - Obezitate (forme severe)
- imunodepresie:
 - HIV
 - Neoplasme
 - Imunodepresie post-medicamenteasa

**FISA PENTRU APRECIEREA OPORTUNITATII INDRUMARII
PACIENTULUI CU MANIFESTARI RESPIRATORII/GRIPA CATRE
SPITAL**

Data: ora:
 Nr. Registrul de consultatie:
 Nume si prenume pacient:
 CNP: Nr. Telefon:
 Adresa:
 In urma anamnezei si a examenului clinic se vor incerca criteriile din tabelul de mai jos care sunt identificate.

CRITERIU	OBSERVATII
1. Dispnee severa:	tiraj, cornaj, incapacitatea de a enunta in intregime o propozitie scurta din cauza lipsei de aer
2. Frecventa respiratorie > 30/min,	masurare pe durata unui minut.
3. Instalarea recenta a unei respiratii patologice	perioade de apnee, alternand cu polipnee
4. Deshidratare severa si/sau soc	pliu cutanat tenes, TA sistolica <90 mmHG, TA diastolica <60 mmHg
5. Alterarea starii de constienta	confuzie, agitatie psihomotorie, convulsii
6. Alte manifestari severe recent instalate si fara cauza evidenta	deteriorarea rapida a starii pacientului

- Criteriile sunt orientative, nu inlocuiesc rationamentul medical
- Febra izolata nu este criteriu de indrumare catre spital si are valoare redusa pentru aprecierea severitatii
- In cazul agravarii starii clinice pacientilor li se recomanda sa se prezinte la un spital de boli infectioase
- Pentru fiecare pacient evaluat trebuie inregistrata ziua si ora consultului.

Diagnostic de probabilitate:.....

Patologii asociate si tratament (daca exista):.....

Daca Pacientul prezinta cel putin 1 criteriu din cele mentionate in tabel, acesta va fi indrumat catre spitalul de boli infectioase/unitate de primiri urgente.

Precizati numar salvare si numele insotitorului:.....

Precizati unitatea medicala catre care ati indrumat pacientul:.....

Nume medic si parafa:.....

Anexa 2**CAZ COMPATIBIL CU GRIPA**

Daca sunt prezente urmatoarele,

- debut brusc;
- febra >38 C SI
- tase sau dureri in gat,

caz suspect de gripe (forma clinica usoara-medie)

Contact
caz confirmat gripe AHIN1
(vezi anexa 3)

Caz izolat sau contact cu cazuri cu simptomatologie respiratorie,
neconfirmate de gripe AHIN1

fara FR:
Nu se recolteaza exudat
izolare la domiciliu,
fara tratament antiviral,
tratament simptomatic,
supraveghere la domiciliu,

cu FR
se propune internarea, se raporteaza nominal, imediat la DSPJ → CNSCBT

accepta nu accepta

semneaza fisa speciala si se izoleaza la domiciliu

- se recolteaza exudat Neg
 - tratament simptomatic Se interupe tratamentul antiviral
 - tratament antiviral pentru 48 ore
 - se asteapta rezultatul PCR Poz
 Se continua tratamentul 7 zile, fara proba de control, se completeaza fisa OMS finala

FR= factor de risc; **TOATE CAZURILE** se raporteaza numeric saptamanal, cod J10-11, conform metodologiei

Anexa 3

CONTACT CU CAZ CONFIRMAT A HINI PRIN RT-PCR :

Daca sunt prezente urmatoarele,


- debut brusc;
- febra >38 C SI
- tuse sau dureri in gat.



Se confirma clinic si epidemiologic ca si caz de gripe AH1N1
Nu se recolteaza test pentru confirmare RT-PCR

Se completeaza FU/OMS

Se raporteaza DSPJ




*raportare imediata; forma **finală** a fisiei OMS, imediat dupa completare

Anexa 4


CAZ DE INFECTIE RESPIRATORIE ACUTA SEVERA (SARI):

Peste 5 ani: debut pe parcursul a 7 zile anterioare care necesita spitalizare si constau in:
febra >38 C SI tuse sau dureri in gat SI timpi respiratori scurtați SAU dificultati la respiratie (dispnee)
Copil sub 5 ani: pneumonie forma medie sau severa (vezi definitii din metodologie)



Anexa 5

MANAGEMENTUL FOCARELOR DE GRIPA AH1N1



Anexa 6**PERSOANELE CARE AU INTRAT/REVENIT IN ROMANIA CU MAXIMUM 7 ZILE ANTERIOR**

Daca sunt prezente urmatoarele:

- debut brusc
- febra >38 C
- tuse sau dureri in gat,



Se recolteaza exudat NUMAI de la cazurile cu factor de risc/forme clinice severe

**ATENTIE !!****SE RAPORTEAZA CAZUL NOMINAL, IMMEDIAT LA DSPJ**

In FO precum si la raportare catre DSPJ se precizeaza OBLIGATORIU urmatoarele date:

- varsta
- sex
- data revenirii/intrarii in Romania
- tara din care vin
- data aparitiei primelor manifestari clinice
- daca au fost simptomatici in interval de timp in care nu s-au aflat in Romania se va preciza:
 - daca au fost examinati medical si
 - daca au primit antivirale (cu precizarea antiviralului administrat).

SE VA COMPLETA CORECT SI COMPLET BULETINUL DE INSOTIRE PROBE



In continuare se va aplica metodologia adevarata tabeloului clinic constatat.